

リレンザ[®]を処方された 患者様・ご家族・周囲の方々へ

特に小児・未成年者において、インフルエンザ発症後にリレンザの吸入の有無を問わず、異常行動などの精神・神経症状が発現することが知られています。

この異常行動などの精神・神経症状については、多くがインフルエンザによる発熱後 24 時間以内の比較的早期に、また、睡眠中に発現することもあるといわれています。

このようなことから、自宅で療養される場合、異常行動による転落等の事故を防ぐために、インフルエンザと診断されてから少なくとも 2 日間、保護者の方は、就寝中も含めて、小児・未成年者を 1 人きりにさせないようにしてください。

<異常行動などの精神・神経症状>

普段と違うとっぴな行動をとる、うわごとを言ったり興奮したりする、幻覚が見える、妄想、意識がぼんやりする、意識がなくなる、意識が混濁する、けいれん等

リレンザ[®]を吸入する時の注意点

このお薬の吸入は、椅子やベッドに座るなどリラックスした状態で吸入しましょう。

インフルエンザウイルス感染症は急激な発熱(38～39℃以上)や脱水症状などにより体力が低下しています。過度に強く吸引したり、長く息止めをすると失神/転倒などを誘発し、思わぬ怪我をすることがあります。万が一の事故を防止する為に、立って吸入を行わず、下図のようにリラックスした態勢で吸入を行うようして下さい。

注意事項

この薬は1回にブリスター2つの吸入が必要です。


治療に用いる場合 朝 ブリスター2つ | 夜 ブリスター2つ

※治療の場合は、5日間

予防に用いる場合 1日1回(同じ時刻に):ブリスター2つ

※予防の場合は、10日間

- 吸入前に、「吸入口」内部が汚れていないことを確認してください。
- この吸入器は、他の薬には使用しないでください。
- 吸入後は、清潔保持のためカバーをしてください。



※添加物として乳糖が含まれており乳アレルギーのある人は注意が必要です。
※その他、何か気になることがありましたら、医師・薬剤師にご相談ください。